

lattanti

> 1 anno: bambini & adulti

Le manovre indicate sotto si iniziano a eseguire solo quando le vie aeree sono completamente ostruite (finché il bambino tossisce e urla, non eseguire le seguenti sequenze (la tosse infatti è la migliore reazione dell'organismo per liberare le vie aeree). Se quindi il bambino non respira più iniziare come evidenziato di seguito. Quando un bambino non respira più, avete pochissimi minuti per salvare la sua vita senza danni neurologici permanenti al suo cervello (coma, paralisi ecc.). Quindi iniziate subito con le manovre senza l'arrivo del personale del 112. Il vostro tempestivo intervento salva la vita del vostro bambino senza danni neurologici permanenti

5 pacche forti tra le scapole.
Attenzione alla colonna vertebrale per le strutture delicate nervose interne!



1) Eseguire senza interruzioni compressioni addominali profonde e vigorose (manovra di Heimlich). [Video](#)

2) Opzionale: 5 pacche tra le scapole in bambini e adulti alternando con le compressioni addominali.
_ Continuare ad alternare le due manovre: [video](#)

3) Alternativa: sdraiata come nella gravida

4) *In gravidanza MAI usare le compressioni addominali!*
Fare la manovra a livello dello sterno. Opzionalmente alternare 5 compressioni con 5 pacche dorsali: [Video](#)

Sostenere la nuca con la mano per evitare danni al midollo spinale con strutture nervose importanti!



Comprimere 5 volte fortemente sullo sterno in corrispondenza della linea intermammillare.
Profondità di compressione: 4 cm.
Non avere paura durante l'esecuzione! Per salvare il lattante, le manovre vanno eseguite bene. Continuare con 5 pacche tra le scapole. Continuare ad alternare le due manovre.



[Video](#)

[sequenza foto](#)



Nel momento in cui la vittima diventa incosciente, passare alla sequenza della rianimazione.

RIANIMAZIONE E RIMOZIONE DI CORPI ESTRANEI DALLE VIE AEREE IN VITTIME INCOSCENTI

La vittima non reagisce, non respira normalmente. Chiamare aiuto ad alta voce.

Allertare il sistema d'emergenza (112) durante le misure salvavita attivando il viva voce sul telefonino. Richiedere all'operatore il DEA (defibrillatore esterno automatizzato) per l'intervento

Tel. 112

disponete il bambino su piano rigido. Avviate la seguente procedura:

30 compressioni toraciche vigorose (non abbiate paura; devono essere efficaci!) (frequenza 100-120/min)

2 ventilazioni

30 : 2

profondità di compressione:

- lattanti/bambini: 1/3 del torace
- adulti: 5-6 cm

comprimere sulla metà inferiore dello sterno

come posizionare la testa:

- lattanti: posizione neutrale
- bambini >1 anno: leggermente-moderatamente iperestesa
- Erwachsene: iperestesa

Oppure: potete eseguire solo le compressioni toraciche, qualora non ci siano dispositivi per la ventilazione per garantire la sicurezza igienica dei presenti

Appena arriva il DEA, seguire le indicazioni dell'apparecchio.

Se non si è certi che venga il 112: dopo 2 min. **richiamare il 112 e richiedere l'AED**

OPZIONALE: in lattanti e bambini in caso di presenza di dispositivi di barriera per la ventilazione (come pcketmask, salvietta protettiva, pallone e maschera) o la possibilità di eseguire in maniera sicura la ventilazione bocca-bocca: 5 ventilazioni.

(in caso di personale addestrato soprattutto con 2 soccorritori: lattanti, bambini, annegati:15:2)

Tecnica lattante



compressioni toraciche: metodo 2 dita – testa in posizione neutrale



Alternativa (soprattutto in caso di 2 soccorritori) : metodo 2 pollici: [video](#)



Respirazione bocca-naso/bocca

Video della misura: [Video](#)

DEA defibrillatore nei lattanti e bambini piccoli: un elettrodo va messo sulla faccia anteriore del torace e l'altro sulla faccia posteriore. Se non ci sono disponibili elettrodi pediatrici si possono usare quelli per adulti.

Tecnica > 1 anno: bambino & adulto



compressioni



bambino grande: 2 mani



Con 1 o 2 mani



compressioni adulto: 2 mani



Respirazione bocca-bocca bambino grande / adulto

iperestendere di più la testa

Respirazione bocca-bocca

iperestendere moderatamente la testa

Video della misura [Video](#)

Video della misura – bambino grande [Video](#)

Video della misura - adulto [Video](#)

Per l'approfondimento si consiglia di frequentare i corsi intensivi delle associazioni d'emergenza sanitaria e di altre istituzioni formative

27.2.-9.8.2017

© 2017 PSRC www.0-18.eu

Uso del Defibrillatore Esterno Automatizzato (DEA)



ACCENDERE il DAE
e seguire le istruzioni



Idealmente 2 persone eseguono RCP e una terza persona porta ed adopera il DEA per interrompere il meno possibile la RCP. Qui dimostriamo il caso più difficile con un solo soccorritore

POSIZIONARE le placche dell'AED sul torace



Dall'età fino a 6 anni utilizzare elettrodi pediatrici se possibile con riduttore di energia.



Se non si dispone di placche di misura pediatrica, è possibile usare placche per adulti.



ALLONTANARSI dalla vittima e analizzare il ritmo



Se AED consiglia la scarica, COMUNICARE di ALLONTANARSI e verificare che nessuno tocchi il paziente

Interrompere la somministrazione di ossigeno

Premere il pulsante SCARICA



Riprendere immediatamente la RCP indipendentemente dal ritmo (compressioni/ventilazioni 30:2)

