

RIANIMAZIONE E RIMOZIONE DI CORPI ESTRANEI DALLE VIE AEREE IN VITTIME INCOSCENTI

La vittima non reagisce, non respira normalmente. Chiamare aiuto ad alta voce.

Allertare il sistema d'emergenza (112) durante le misure salvavita attivando il viva voce sul telefonino. Richiedere all'operatore il DEA (defibrillatore esterno automatizzato) per l'intervento

Tel. 112

disponete il bambino su piano rigido. Avviate la seguente procedura:

30 compressioni toraciche vigorose (non abbiate paura; devono essere efficaci!) (frequenza 100-120/min)

2 ventilazioni

30 : 2

profondità di compressione:

- lattanti/bambini: 1/3 del torace
- adulti: 5-6 cm

comprimere sulla metà inferiore dello sterno

come posizionare la testa:

- lattanti: posizione neutrale
- bambini >1 anno: leggermente-moderatamente iperestesa
- Erwachsene: iperestesa

Oppure: potete eseguire solo le compressioni toraciche, qualora non ci siano dispositivi per la ventilazione per garantire la sicurezza igienica dei presenti

Appena arriva il DEA, seguire le indicazioni dell'apparecchio.

Se non si è certi che venga il 112: dopo 2 min. **richiamare il 112 e richiedere l'AED**

OPZIONALE: in lattanti e bambini in caso di presenza di dispositivi di barriera per la ventilazione (come pocketmask, salvietta protettiva, pallone e maschera) o la possibilità di eseguire in maniera sicura la ventilazione bocca-bocca: 5 ventilazioni.

(in caso di personale addestrato soprattutto con 2 soccorritori: lattanti, bambini, annegati:15:2)

Tecnica lattante



compressioni toraciche: metodo 2 dita – testa in posizione neutrale



Alternativa (soprattutto in caso di 2 soccorritori) : metodo 2 pollici: [video](#)



Respirazione bocca-naso/bocca

Video della misura: [Video](#)

DEA defibrillatore nei lattanti e bambini piccoli: un elettrodo va messo sulla faccia anteriore del torace e l'altro sulla faccia posteriore. Se non ci sono disponibili elettrodi pediatrici si possono usare quelli per adulti.

Tecnica > 1 anno: bambino & adulto



compressioni



bambino grande: 2 mani



Con 1 o 2 mani



compressioni **adulto: 2 mani**



Respirazione bocca-bocca **bambino grande / adulto**

iperestendere di più la testa

Respirazione bocca-bocca

iperestendere moderatamente la testa

Video della misura [Video](#)

Video della misura – bambino grande [Video](#)

Video della misura - adulto [Video](#)

Per l'approfondimento si consiglia di frequentare i corsi intensivi delle associazioni d'emergenza sanitaria e di altre istituzioni formative